

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷六

詳校官太醫院恩糧臣 袁天錫

編修臣 倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣胡紹基

膠錄舉人臣張元功

欽定四庫全書

備急千金要方卷六十

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

腎臟方

補腎第八

論灸法

論曰補方通治五勞六極七傷虛損五勞五臟病六極
六腑病七傷表裏受病五勞者一曰志勞二曰思勞三
曰憂勞四曰心勞五曰疲勞六極者一曰氣極二曰血

極三曰筋極四曰骨極五曰髓極六曰精極七傷者一
曰肝傷善夢二曰心傷善忘三曰脾傷善飲四曰肺傷
善痿五曰腎傷善唾六曰骨傷善饑七曰脉傷善嗽凡
遠思強慮傷人憂悲悲哀傷人喜樂過度傷人忿怒不
解傷人汲汲所願傷人感感所患傷人寒暄失節傷人
故曰五勞六極七傷也論傷甚衆且言其略此方悉主
之

建中湯治五勞七傷小腹急痛膀胱虛滿手足逆冷食

飲苦吐酸痰嘔逆泄下少氣目眩耳聾口焦小便自利

方

膠飴

半斤

黃耆

乾薑

當歸

各三兩

人參

半夏

橘皮

芍藥

甘草

各二兩

附子

一兩

大棗

十五枚

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升半湯成下膠飴

烱沸分四服

深師有桂心六兩生薑一斤無橘皮乾薑

又方治虛損少氣腹脹內急拘引小腹至冷不得屈伸

不能飲食寒熱頭疼手足逆冷大小便難或復下痢口
乾夢中泄精或時吐逆恍惚面色枯瘁又復微腫百節
疼酸方

附子

厚朴

各一兩

人參

甘草

桂心

當歸

茯苓

各二兩

麥門冬

黃耆

龍骨

各三兩

芍藥

四兩

生薑

五兩

飴糖

八兩

生地黄

一斤

大棗

三十枚

右十五味㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓內飴

糖每服八合日三夜一欵者加生薑一倍

又方治五勞七傷虛羸不足面目黧黑手足疼痛久立腰疼起則目眩腹中懸急而有絕傷外引四肢方

生薑

芍藥

乾地黄

甘草

芎藭

各五兩

大棗

三十枚

右六味㕮咀以水六升漬一宿明旦復以水五升合煮取三升分三服藥入四肢百脉似醉狀是效無生薑酒漬乾薑二兩一宿用之常行此方神妙

大建中湯治虛勞寒癖飲在脇下決決有聲飲已如從一邊下決決然也有頭並衝皮起引兩乳內痛裏急善夢失精氣短目眊眊惚惚多忘方

蜀椒

合二

半夏

升一

生薑

斤一

甘草

兩二

人參

兩三

飴糖

兩八

右六味咬咀以水一斗煮取三升去滓內糖溫服七合裏急拘引加芍藥桂心各三兩手足厥腰背冷加附子一枚勞者加黃耆一兩

又方治五勞七傷小腹急臍下彭亨兩脇脹滿腰脊相
引鼻口乾燥目暗眊眊憤憤不樂胃中氣急逆不下食
飲莖中策策痛小便黃赤尿有餘瀝夢與鬼神交通去
精驚恐虛乏方

飴糖

半斤

黃耆

遠志

當歸

千金翼無

澤瀉

各三兩

芍藥

人參

龍骨

甘草

各二兩

生薑

八兩

大棗

二十枚

右十一味㕮咀以水一斗煮取二升半湯成內糖令

烱一服八合消息又一服

深師無飴糖遠志澤瀉龍骨有桂心六兩半夏一升

附子

一枚

小建中湯凡男女因積勞虛損或大病後不復常苦四體沉滯骨肉疼酸吸吸少氣行動喘噎或小腹拘急腰背強痛心中虛悸咽乾脣燥面體少色或飲食無味陰陽廢弱悲憂慘感多卧少起久者積年輕者百日漸至瘦削五臟氣竭則難可復振治之方

甘草

二兩

桂心

生薑

各三兩

芍藥

六兩

膠飴

升一

大棗

十二枚

右六味咬咀以水九升煮取三升去滓內膠飴每服

一升日三間三日復作一劑後可與諸丸散

仲景云嘔家不

可服肘後云加黃耆人參各二兩為佳若患痰滿及澹洩可除膠飴胡洽方有半夏八兩黃耆三兩古今

錄驗名芍藥湯

前胡建中湯治大勞虛劣寒熱嘔逆下焦虛熱小便赤痛客熱上熏頭目及骨肉疼痛口乾方

前胡

三兩

黃耆

芍藥

當歸

茯苓

桂心各二兩

甘草一兩

生薑八兩

白糖

六兩

人參

半夏各六分

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓內糖

分四服

黃耆建中湯治虛勞裏急諸不足方

黃耆

生薑

桂心各三兩

甘草二兩

芍藥

六兩

大棗

十二枚

飴糖一升

右七味㕮咀以水一斗煮取三升去滓內飴令消溫

服一升日三間日可作嘔者倍加生薑腹滿者去棗

加茯苓四兩佳

仲景集驗古今錄驗並同深師治虛勞腹滿食少小便多者無飽糖有人

參二兩半夏一升又治大虛不足小腹裏急勞寒拘引臍氣上衝胸短氣語言謬誤不能食吸吸氣乏悶亂必效方治虛勞下焦虛冷不甚渴小便數者有人參當歸各二兩若失精加龍骨白斂各一兩古今錄驗治虛勞裏急小腹急痛氣引胸脇痛或心痛短氣者以乾薑代生薑加當歸四兩

黃耆湯治虛勞不足四肢煩疼不欲食食即脹汗出方

黃耆

麥門冬

芍藥

桂心

各三兩

甘草

當歸

五味子

細辛

人參

各二兩

大棗

二十枚

前胡

六兩

茯苓

四兩

生薑

半夏

各八兩

右十四味咬咀以水一斗四升煮取三升每服八合

日二服

深師方治虛乏四肢沉重或口乾吸吸少氣便利諸不足者無麥門冬五味子細辛前

胡有桑螵蛸二十枚治丈夫虛勞風冷少損或大病後未平復而早牽勞腰背強直脚中疼弱補諸不足者無五味子細辛有遠志橘皮各二兩蜀椒一兩烏頭三枚小品方治虛勞少氣小便過多者無五味子細辛人參前胡茯苓半夏有黃芩一兩地黃二兩以水九升煮取三升治虛勞胸中客氣塞冷癖痞宿食不消吐噫脇間水氣或流飲腸鳴食不生肌肉頭痛上重下輕目眊眊忽忽去來躁熱臥不得安小腹急

小便赤餘瀝臨事不起陰下濕或小便白濁傷多者
無麥門冬五味子細辛當歸前胡茯苓半夏有厚朴
二兩胡洽方治五臟內傷者無麥門冬五味子當歸
細辛前胡茯苓名大黃耆湯延年秘錄方主補虛損
強腎氣者無麥門冬五味子細
辛前胡有防風芍藥各三兩

樂令黃耆湯治虛勞少氣胃心淡冷時驚惕心中悸動
手脚逆冷體常自汗五臟六腑虛損腸鳴風濕榮衛不
調百病補諸不足又治風裏急方

黃耆

人參

橘皮

當歸

桂心

細辛

前胡

芍藥

甘草

麥門冬

茯苓

各二兩

生薑

五兩

半夏

二兩半

大棗

二十枚

右十四味咬咀以水二斗煮取四升每服五合日三

夜一

深師方無橘皮細辛前胡甘草麥門冬有烏頭三兩蜀椒二兩遠志二兩胡洽崔氏有蜀椒一

兩烏頭五枚崔氏名藥令大黃耆湯

腎瀝湯治虛勞損羸乏欬逆短氣四肢煩疼腰背相引痛耳鳴面黧黥骨間熱小便赤黃心悸目眩諸虛乏方

羊腎

一具

桂心

一兩

人參

澤瀉

五味子

甘草

防風

芎藭

地骨皮

黃耆

當歸

各二兩

茯苓

玄參

芍藥

生薑

各四兩

磁石

五兩

右十六味咬咀以水一斗五升先煮腎取一斗去腎

入藥煎取三升分三服可常服之

廣濟方治虛勞百病者無人參甘草

芎藭當歸芍藥生薑玄參有茯苓三兩牛膝五加皮各二兩胡洽治大虛傷損夢寤驚悸上氣肩息腎中風濕小腹裏急引腰脊四肢常苦寒冷大小便澀利無常或赤或白足微腫或昏僻善忘者無澤瀉防風黃耆玄參磁石地骨皮有黃芩一兩麥門冬乾地黃遠志各三兩大棗二十枚崔氏治腎藏虛勞所傷補

益者無芴窮玄參磁石地骨皮有黃芩遠志各二兩
乾地黃三兩麥門冬四兩大棗二十枚治五勞六極
八風十二痺補諸不足者無澤瀉甘草五味子防風
芍藥生薑玄參地骨皮有附子牡丹皮各一兩乾地
黃一兩半牡荊子菖蒲桑螵蛸各二兩經心錄治腎
氣不足耳無所聞者無澤瀉甘草五味子防風黃耆
芍藥生薑玄參地骨皮有附子牡丹皮牡荊子各一
兩乾地黃三兩大棗十五枚名羊腎湯近效方除風
下氣強腰脚明耳目除痰飲理榮衛永不染時疾諸
風者無當歸芍藥磁石有獨活牛膝各一兩半麥門
冬二兩丹參五兩為煮散都分二十四貼每貼
入生薑一分杏仁十四枚水三升煮取一升

又方牀羊腎

一具切去脂以水一斗
六升煮取一斗三升

大棗

二十枚

桑白皮

六兩

五味子

黃耆

薇蓉

防風

巴戟天

秦艽

澤瀉

人參

桂心

薯蕷

丹參

遠志

茯苓

細辛

牛膝

各三兩

石斛

生薑

各五兩

杜仲

磁石

各八兩

右二十二味咬咀內腎汁中煮取三升分三服相去如人行五里再服

增損腎瀝湯治大虛不足小便數噓吸焦燔引飲膀胱滿急每年三伏中常服此三劑於方中商量用之

羊腎

具一

麥門冬

地骨皮

人參

石斛

澤瀉

枯萋根

乾地黃

遠志

生薑

甘草

當歸

桂心

茯苓

五味子

桑白皮

一作桑寄
生各二兩

大棗

三十
枚

右十七味㕮咀以水一斗五升先煮腎取一斗二升

去腎內藥煮取三升去滓分三服

小品方無石斛枯
萋根地骨皮桑白

皮茯苓有芳莠黃連龍骨各二兩螭蛸二十枚又治
腎氣不足痛渴引飲小便過多腰背疼痛者無石斛

括蕒根地骨皮桑白皮甘草有芎藭二兩黃芩芍藥
各一兩桑螵蛸二十枚雞肫脰黃皮一兩崔氏治藏
損虛勞李子豫增損者無石斛括蕒根地骨
皮桑白皮有黃耆黃芩芍藥防風各二兩

治左脇氣衝膈上滿頭上有風如蟲行手足頑痺鼻塞
脚轉筋不能伸縮兩目時腫痛方

猪腎一具

防風

芎藭

橘皮

澤瀉

桂心

石斛各一兩

生薑

丹參

茯苓

通草

半夏各一兩

乾地黃三兩

右十三味咬咀以水一斗半煮腎減三升去腎下藥
煮取二升七合去滓分三服

五補湯治五臟內虛竭短氣欬逆傷損鬱悵不足下氣
通津液方

五味子

桂心

甘草

人參

各一兩

麥門冬

小麥

各一升

生薑

八兩
金翼無

粳米

三合

薤白

枸杞根白皮

各一斤

右十味咬咀以水一斗二升煮取三升每服一升日

三口燥者先煮竹葉一把水減一升去葉內諸藥煮之

凝唾湯治虛損短氣咽喉凝唾不出如膠塞喉方一名茯苓湯

麥門冬五兩

人參二兩

前胡三兩

甘草

乾地黄

桂心

芍藥各一兩

大棗三十枚

茯苓二兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升分溫三服

補湯方

車前子

兩三

防風

桂心

兩各三

巴戟天

丹參

乾地黄

鹿茸

枸杞皮

五加皮

兩各五

右九味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服

人參湯治男子五勞七傷胃中逆滿害食乏氣嘔逆兩脅下脹小腹急痛宛轉欲死調中平臟理絕傷方

人參

當歸

芍藥

甘草

生薑

麥門冬

白糖

桂心

各二兩

前胡

茯苓

五味子

蜀椒

橘皮

各一兩

枳實

三兩

大棗

十五枚

右十五味咬咀取東流水一斗半漬藥半日用三年陳蘆稍煎取四升內糖復上火煎令十數沸年二十以上六十以下一服一升二十以下六十以上一服七八合雖年盛而久羸者亦服七八合日三夜一不爾藥力不接則不能救病要用勞水陳蘆不則水强

火盛猛即藥力不出也貞觀初有人久患羸瘦殆死
余處此方一劑則瘥如湯沃雪所以錄記之餘方皆
爾不能一一具記

內補散治男子五勞六絕其心傷者令人善驚妄怒無
常其脾傷者令人腹滿喜噫食竟欲臥面目痿黃其肺
傷者令人少精腰背痛四肢厥逆其肝傷者令人少血
面黑其腎傷者有積聚小腹腰背滿痺欬唾小便難六
絕之為病皆起於大勞脉虛外受風邪內受寒熱令人

手足疼痛膝以下冷腹中雷鳴時時泄痢或閉或利面
目腫心下憤憤不欲語憎聞人聲方

乾地黄

菟絲子

山茱萸

地麥

各五分

遠志

巴戟天

各半兩

麥門冬

五味子

甘草

人參

茯苓

石斛

桂心

茯苓

附子

各一兩半

右十五味治下篩酒服方寸匕日三加至三七無所
禁

石斛散治大風四肢不收不能自反覆兩肩疼痛身重
脛急筋腫不能行時寒時熱足腠如刀刺痛身不能自
任此皆得之飲酒中大風露臥濕地寒從下入腰以下
冷不足無氣子精虛衆脉寒陰下濕莖消令人不樂恍
惚時悲此方除風輕身益氣明目強陰令人有子補不
足方

石斛

分十

牛膝

分二

附子

杜仲

分各四

栢子仁

石龍芮

芍藥

松脂

雲母粉

山茱萸

澤瀉

萆薢

菟絲子

防風

細辛

桂心

各三分

右十六味治下篩酒服方寸匕日再陰不起倍菟絲子杜仲腹中痛倍芍藥膝中痛倍牛膝背痛倍萆薢腰中風倍防風少氣倍栢子仁麋不能行倍澤瀉隨病所在倍三分亦可為丸以棗膏丸如梧子酒服七丸

腎瀝散治虛勞百病方

牀羊腎

一具
陰乾

茯苓

一兩
半

五味子

甘草

巴戟天

桂心

石龍芮

牛膝

山茱萸

防風

乾薑

細辛

各一兩

乾地黄

二兩

人參

鍾乳粉

石斛

菟絲子

丹參

茯苓

附子

各五分

右二十味治下篩合鍾乳粉和攪更篩令勻平旦清

酒服方寸匕稍加至二匕日再

又方治男子五勞七傷八風十二痺無有冬夏悲憂懣

黃芩

各一兩

乾薑

附子

防風

菖蒲

牛膝

各一兩半

桔梗

二兩半

薯蕷

秦艽

各二兩

右三十七味治下篩酒服方寸匕日三忌房室

又方

石龍芮

續斷

桔梗

乾薑

菖蒲

山茱萸

茯苓

各二兩

薯蕷

蜀椒

芍藥

巴戟天

人參

龍膽

女萎

厚朴

肉蓯蓉

細辛

萆薢

附子

石斛

黃耆

芎藭

白斂

烏頭

天雄

桂心

各一兩半

秦艽

白朮

礬石

一作礬石

五味子

牡荊子

菊花

牛膝

各一兩

遠志

二兩半

乾漆

三兩

羊腎

一具陰乾

右三十六味治下篩酒服方寸匕日三

此方比前方無澤瀉黃芩

防風有烏頭天雄各一兩半餘並同

薯蕷散補丈夫一切病不能具述方

薯蕷

荆實

一方用續斷一方用枸杞子

遠志

茯苓

一方用茯神

牛膝

菟絲子

巴戟天

杜仲

各一兩

從蓉

二兩

五味子

山茱萸

一用防風蛇牀子二分

右十二味治下篩酒服方寸匕日二夜一惟禁醋蒜

自外無忌服後五夜知覺十夜力生十五夜力壯如
盛年二十夜力倍若多忘加遠志茯苓體澀加栢子

仁服三兩劑益肌肉亦可為丸每服三十九日二夜
一以頭面身體暖為度其藥和平不熱調五臟久服
健力不可當婦人服之面生五色

補五勞方

五月五日採五加莖七月七日採葉九月九日取根
治下篩服方寸匕日三長服去風勞妙

治五勞六極七傷虛損方

菴蓉

白龍骨

陽起石

續斷

天雄

各七分

牡蠣

五味子

蛇牀子

乾地黄

桑寄生

天門冬

白石英

各二兩

地膚子

車前子

韭子

菟絲子

各五分

地骨皮

八分

右十七味治下篩酒服方寸匕日三服

鍾乳散治五勞七傷虛羸無氣力傷極方

鍾乳

六兩無間粗細以白淨無赤黃黑為上鍋鑊中可盛三二斗并取粟粗糠二合許內鑊中

煮五六沸乃內乳煮水欲減又添如故一晷時出以暖水淨淘之曝乾玉硃研不作聲止重密絹水

下澄
取用

鹿角
白者

白馬莖
別擣

硫黃
別研

石斛

鐵精

人參

磁石

桂心

蠶蠶
各一兩

蛇牀子
三兩

右十一味為末以棗膏和擣三千杵酒服三十九如

梧子日再慎房室及生冷酢滑雞猪魚陳敗

寒食鍾乳散治傷損乏少氣力虛勞百病令人丁彊飲

食去風冷

方見氣極篇中

地黃散主益氣調中補絕令人嗜食除熱方

生地黃三十斤細切曝乾取生者三十斤搗汁漬之
令相得出曝乾復如是九反曝搗末食後酒服方寸
匕勿令絕

三石散治風勞毒冷百治不瘥補虛方

鍾乳

紫石英

白石英

白朮

桔梗

防風各五分

栝蒌根

人參

蜀椒

乾薑

附子

牡蠣

桂心

杜仲

細辛

茯苓各十分

右十六味治下篩酒服方寸七日三行十數步至五十步以上服此大佳少年勿用自餘補方通用老少

皆宜冬月服之

千金翼名更生散赤石脂不用紫石英蜀椒杜仲茯苓為十三味

石韋圓黃帝問五勞七傷於高陽負高陽負曰一曰陰衰二曰精清三曰精少四曰精消五曰囊下濕六曰腰

一作胃脅苦痛七曰膝厥痛冷不欲行骨熱遠視淚出口

乾腹中鳴時有熱小便淋瀝莖中痛或精自出有病如此所謂七傷一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞

五曰疲勞此謂五勞黃帝曰何以治之高陽貢曰石韋
丸主之

石韋

細辛

礬石

遠志

茯苓

澤瀉

菖蒲

杜仲

蛇牀子

肉蓯蓉

桔梗

天雄

牛膝

山茱萸

栢子仁

續斷

薯蕷

各二兩

防風

赤石脂

各三兩

右十九味為末取棗膏如蜜和丸如梧子酒服三十

九日三七日愈二十日百病除長服良

崔氏無礬石
茯苓澤瀉桔

梗薯蕷括萎根二
兩半云白水候方

五補圓治腎氣虛損五勞七傷腰脚酸疼肢節苦痛目
暗眵眵心中喜忘恍惚不定夜臥多夢覺則口乾食不
得味心常不樂多有恚怒房室不舉心腹脹滿四體疼
痺口吐酸水小腹冷氣尿有餘瀝大便不利悉主之
服延年不老四時勿絕一年萬病闕愈之方

杜仲

巴戟天

人參

五加皮

五味子

天雄

牛膝

防風

遠志

石斛

薯蕷

狗脊各四分

乾地黄

菴蓉各十分二分

鹿茸十五分

菟絲子

茯苓

各五分

覆盆子

石龍芮

各八分

草薢

蛇牀子

石南

白朮

各三分

天門冬

七分

右二十四味為末蜜丸如梧子酒服十九日三有風

加天雄芳藟當歸黃耆五加皮石南荻神獨活栢子

仁白朮各三分有氣加厚朴枳實橘皮各三分冷加

乾薑桂心吳茱萸附子細辛蜀椒各三分泄精加韭
子白龍骨牡蠣鹿茸各三分泄痢加赤石脂龍骨黃
連烏梅肉各三分春依方服夏加地黃五分黃芩三
分麥門冬四分冷則去此加乾薑桂心蜀椒各三分
若不熱不寒亦不須增損直爾服之三劑以上即覺
庶事悉佳慎酢蒜鱸陳臭大冷醉吐自外百無所慎
稍加至三十丸不得增常以此為度

無比薯蕷圓治諸虛勞百損方

薯蕷

兩

茯苓

兩

五味子

兩

菟絲子

杜仲

兩

牛膝

山茱萸

乾地黄

澤瀉

茯苓

一作茯苓

巴戟天

赤石脂

兩

右十二味為末蜜丸如梧子食前酒服二十九加至
三十丸日再無所忌惟禁醋蒜陳臭等物服七日後
令人健四體潤澤唇口赤手足暖而有光彩消食身
體安和音聲清朗是其驗也十日後長肌肉其藥通

中入腦鼻必酸疼勿恠若求大肥加燉煌石膏二兩
失性健忘加遠志一兩體少潤澤加栢子仁一兩古今

錄驗有白馬莖二兩共十六味治丈夫五勞七傷頭
痛目眩手足逆冷或煩熱有時或冷痺骨疼腰髁不
隨食雖多不生肌肉或少食而脹滿體澀無光澤陽
氣衰絕陰氣不行此藥能補十一經脉起陰陽通內
制外安竟定鳧開三焦破積聚厚腸胃消五臟邪氣
除心內伏熱強筋練骨輕身明目除風去冷無所不
治補益處廣常須服餌為佳七十
老人服之尚有非常力況少者乎

大薯蕷圓治男子女人虛損傷絕頭目眩骨節煩痛飲
食微少羸瘦百病方

薯蕷

附子

古今錄作茯苓

人參

澤瀉

各八分

天門冬

乾地黄

黃芩

當歸

各十分

乾漆

杏仁

阿膠

各二分

白朮

白朮

古今錄作防風

芍藥

石膏

前胡

各三分

桔梗

乾薑

桂心

各四分

大黃

六分

五味子

十六分

甘草

二十分

大豆卷

五十分古今錄作黃耆

大棗

一百枚

右二十四味為末蜜和棗膏搗三千杵丸如梧子酒

服五九日三漸增至十九

張仲景無附子黃芩石膏乾漆五味子大黃有神翅

十分芩藟防風各六分茯苓五分九如彈丸每服一丸以一百丸為劑

腎氣圓治虛勞腎氣不足腰痛陰寒小便數囊冷濕尿有餘瀝精自出陰痿不起忽忽悲喜方

乾地黄

分八

遠志

防風

乾薑

牛膝

麥門冬

姜蕤

薯蕷

石斛

細辛

地骨皮

甘草

附子

桂心

茯苓

山茱萸

四分

從蓉

鍾乳粉

分十

殺羊腎

具一

右十九味為末蜜丸如梧子酒服十五丸日三稍加

至三十九

古今錄驗無遠志防風乾薑牛膝地骨萎
蕤甘草鍾乳有狗脊一兩黃耆四兩人參

三兩澤瀉乾薑各
二兩大棗一百枚

又方治男子婦人勞損虛羸傷寒冷乏少無所不治方

石斛

二兩

紫苑

牛膝

白朮

各五分

麻仁

一分

人參

當歸

茯苓

芡實

大豆卷

黃芩

甘草

各六分

杏仁

蜀椒

乾地黄

防風

桂心

各四分

羊腎

具一

一方有菟蓉六分

右十八味為末蜜丸如梧子酒服十九日再漸增之

又方此方勝胡公腎氣丸及五石丸

乾地黄

茯苓

玄參

各五兩

澤瀉

薯蕷

山茱萸

桂心

芍藥

各四兩

附子

三兩

右九味為末蜜丸如梧子酒服二十丸加至三十丸

以知為度

千金翼有牡丹皮四兩為十味

又方治腎氣不足羸瘦日劇吸吸少氣體重耳聾眼暗

百病方

桂心

四兩

乾地黄

一斤

澤瀉

薯蕷

茯苓

各八兩

牡丹皮

六兩

半夏

一斤

右七味為末蜜丸如梧子大酒服十九日三

八味腎氣圓治虛勞不足大渴欲飲水腰痛小腹拘急

小便不利方

乾地黄

八兩

山茱萸

薯蕷

各四兩

澤瀉

牡丹皮

茯苓

各三兩

桂心

附子

各二兩

右八味為末蜜丸如梧子大酒下十五丸日三加至

二十五丸

仲景云常服去附子加五味子姚公云加五味子三兩茯苓四兩張文仲云五味子

茯苓各四兩肘後方云地黄四兩澤瀉附子各一兩餘各二兩

黃耆圓治五勞七傷諸虛不足腎氣虛損目視眈眈耳

無所聞方

黃耆

乾薑

當歸

羌活

一作白朮

芎藭

甘草

茯苓

細辛

桂心

烏頭

附子

防風

人參

芍藥

石斛

乾地黄

茯苓

各二兩

棗膏

五合

羊腎

一具

右十九味為末以棗膏與蜜為丸如梧子大酒服十

五九日二加至三十九一方無芎藭乾薑當歸羌活

止十四味

古今錄驗無羊腎有羌活鍾乳紫石英石硫黃赤石脂白石脂礬石各二分名五石

黃耆
凡

又方療虛勞方

黃耆

鹿茸

茯苓

烏頭

乾薑

各三分

乾地黄

當歸

桂心

芍藥

各四分

枸杞白皮

菟絲子

五味子

栢子仁

白朮

各五分

大棗

二十枚

右十五味為末蜜丸如梧子平旦酒服十九夜十九
以知為度禁如藥法

神化圓治五勞七傷氣不足陰下濕癢或生瘡小便數
有餘瀝陰頭冷疼失精自出小腹急繞臍痛膝重不能
久立目視漠漠見風淚出脛酸精氣衰微臥不欲起手
足厥冷調中利食方

菰蓉

牛膝

薯蕷

各六分

續斷

山茱萸

大黃

各五分

遠志

澤瀉

天雄

栢子仁

菟絲子

人參

防風

石斛

枯薑根

杜仲

黃連

白朮

甘草

礬石

當歸

各一兩

桂心

石南

乾薑

蛇床子

赤石脂

葶藶

茯苓

細辛

菖蒲

芎藭

各三分

右三十一味為末蜜丸如梧子酒服五九日三加至

二十九

三仁九子圓治五勞七傷補益方

酸棗仁

栢子仁

薏苡仁

菟絲子

菊花子

枸杞子

蛇牀子

五味子

菴蘭子

地膚子

烏麻子

牡荊子

乾地黄

薯蕷

桂心

各二兩

蓯蓉

三兩

右十六味為末蜜丸如梧子酒服二十九日二夜一
填骨圓治五勞七傷補五臟除萬病方

石斛

人參

當歸

牡蒙

石長生

石韋

白朮

遠志

蓯蓉

巴戟天

紫苑

茯苓

乾薑

天雄

蛇牀子

牛膝

牡蠣

附子

牡丹

栢子仁

甘草

薯蕷

阿膠

乾地黃

五味子

各二兩
蜀椒三兩

右二十六味為末白蜜和丸如梧子大酒服三九日

三

通明圓治五勞七傷六極彊力行事舉重重病後骨髓

未滿房室所食不消胃氣不平方

麥門冬

三斤

乾地黃

石韋

各一斤

紫苑

五味子

肉蓯蓉

甘草

阿膠

杜仲

遠志

茯苓

天雄

各半斤

右十二味為末蜜丸如梧子食上若酒服十九日再

加至二十九

補虛益精大通圓治五勞七傷百病方

乾地黃

八兩

乾薑

當歸

石斛

肉蓯蓉

天門冬

白朮

甘草

芍藥

人參

各六兩

麻子仁

半兩

紫苑

大黃

黃芩

各五兩

蜀椒

三升

防風

四兩

茯苓

杏仁

各三兩

白芷

一兩

右十九味為末白蜜棗膏丸如彈子空腹服一九日

三服十日效

赤石脂圓治五勞七傷每事不如意男子諸疾方

赤石脂

山茱萸

七分

防風

遠志

括蔞根

牛膝

杜仲

薯蕷

各四分

石韋

分三

肉蓯蓉

分二

蛇牀子

分六

菖蒲

續斷

天雄

栢子仁

分各五

右十五味為末蜜棗膏和丸如梧子大空腹服五九

日三服十日知久服不老加菟絲子四分佳

鹿角圓補益方

鹿角

白馬莖

石斛

薯蕷

乾地黄

人參

菟絲子

防風

蛇牀子

分各五

山茱萸

杜仲

赤石脂

澤瀉

乾薑各四分

石龍芮

遠志各三分

五味子

牛膝

巴戟天各六分 天雄二分

茯苓七分

一方無乾薑五味子

右二十一味為末蜜丸如梧子酒服三十丸日二忌

米醋

茯苓圓補虛益氣治五臟虛勞損傷陰痺陰下濕癢或生瘡莖中痛小便餘瀝四肢噓吸陽氣絕陽脉傷方

茯苓

薯蕷

各五分

蛇牀子

遠志

各四分

菟絲子

分六

天雄

分八

五味子

分七

山茱萸

分七

巴戟天

分四

右九味為末蜜丸如梧子酒服二十丸日二加至二

十五丸

乾地黄圓治五勞七傷六極臟腑虛弱飲食不下顏色
黧黯八風所傷補虛益氣進食資顏色長陽方

乾地黄

茯苓

天雄

各七分

蛇牀子

分六

桂心

麥門冬各五分 遠志

茯苓

杜仲

甘草各十分 五味子四分

阿膠

棗肉

各八分

右十三味為末蜜丸如梧子酒下二十九日再加至
三十丸常服彌佳

治虛勞不起囊下癢汗出小便淋瀝莖中數痛尿時赤
黃甚者失精劇苦溺血目視眊眊見風淚出莖中冷精
氣衰兩膝腫不能久立起則目眩補虛方

蛇牀子

細辛

天雄

大黃

栢子仁

菟絲子

杜仲

茯苓

防風

葶藶

菖蒲

澤瀉

各四兩

遠志

牛膝

各六分

栝蒌根

三分

山茱萸

桂心

蓯蓉

薯蕷

蜀椒

石韋

白朮

各五分

右二十二味為末蜜丸如梧子酒服十五丸日再漸加至五十九日身體輕三十日聰明五十日康

健復壯

覆盆子圓治五勞七傷羸瘦補益令人充健方

覆盆子

菟絲子各十分 菟蓉

鹿茸

巴戟天

白龍骨 茯苓

天雄

白石英

五味子

續斷

薯蕷

各十分

乾地黄

八分

蛇床子

五分

遠志

乾薑

各六分

右十六味為末蜜丸如梧子酒服十五丸日再細細

加至三十九慎生冷陳臭

張文仲方無龍骨鹿茸天雄續斷石英有石斛白朮

桂心 枸杞子 人參 栢子仁 澤瀉 各六分 牛膝 四分
分 山茱萸 五分 赤石脂 甘草 各八分 細辛 四分
治五勞七傷 虛羸無力 傷極方

菟絲子

五味子

各二兩

蛇床子

一兩

右三味為末 蜜丸如梧子 每服十九日 三服 禁如常
法

補益方

乾漆

栢子仁

山茱萸

酸棗仁

各四分

右四味為末蜜丸如梧子每服二七丸加至二十九

日二

曲囊圓治風冷補虛弱亦主百病方

乾地黄

薯蕷

牡蠣

天雄

蛇牀子

遠志

杜仲

鹿茸

桂心

五味子

鹿藥草

石斛

車前子

菟絲子

肉蓯蓉

雄雞肝

未連蠶蛾

各等分

右十七味欲和任意擣末蜜丸如小豆大酒服三丸
加至七九日三夜一禁如常法須令常有藥氣大益
人服藥十日以後少少得強

崔平世治五勞七傷方

鍾乳粉

萆薢各一分

巴戟天二分

乾薑

三分一作
乾地黄

菟絲子

茯苓各二分

右六味為末蜜丸如梧子酒服七九日三服訖行百
步酒服三合更行三百步胃中熱定即食乾飯牛羊

兔肉任為羹去肥膩餘不忌

明目益精長志倍力久服長生耐老方

遠志

茯苓

細辛

菟絲子

木蘭

續斷

人參

菖蒲

龍骨

當歸

芎藭

茯神

各五分

右十二味為末蜜丸如梧子服七丸至十九日二夜
一滿三年益智

磁石酒療丈夫虛勞冷骨中疼痛陽氣不足陰下疥一作

痛熱方

磁石

石斛

澤瀉

防風

各五兩

杜仲

桂心

各四兩

天雄

桑寄生

天門冬

黃耆

各三兩

石南

二兩

狗脊

八兩

右十二味咬咀以酒四斗浸漬服三合漸加至五合
日再服亦可單漬磁石服之

石英煎治男子女人五勞七傷消枯羸瘦風虛痼冷少
氣力無顏色不能動作口苦咽燥眠中不安惡夢驚懼

百病方

白石英

碎如米以醇酒九升銅器中微火煎取三升以竹篾攪勿住手去滓澄清

紫石英

各一斤製同上

乾地黄

一斤 白蜜

酥

桃仁

各三升 石斛

五兩 栢子仁

遠志

茯苓

山茱萸

人參

麥門冬

桂心

乾薑

五味子

白朮

菝葜

甘草

天雄

白芷

細辛

芳薊

黃耆

防風

薯蕷

各二兩

右二十四味治下篩內煎中如不足加酒取足為限煎令可丸丸如梧子大酒服二十九日三稍加至四十丸為度無藥者可單服煎令人肥白充實

麋角圓丸

取當年新角連腦頂者為上看角根有斫痕處亦堪用退角根下平者是不堪諸麋角丸方凡有一百一十方此特出衆方之外容成子羔服而羽化夫造此

藥取角五具或四具三具兩具一具為一劑先去尖
一大寸即各長七八寸取勢截斷量把鎔得即於長
流水中以竹器盛懸浸可十宿如無長流水處即於
淨盆中滿著水浸每夜易換即將出削去皺皮以利
鎔鎔取白處至心即止以清粟米泔浸兩宿初經一
宿即乾握去舊水置新絹上曝乾淨擇去惡物粗骨
皮及鎔不勻者即以無灰美酒於大白瓷器中浸經
兩宿其酒及器物隨藥多少其藥及酒俱入淨釜中

初武火煮一食久後即又著火微煎如蟹目沸以柳木筴長四尺濶三指徐攪不得住手困則易人時時更添美酒以成煎為度煎之皆須平旦下手不得經兩宿仍看屑消似希膠即以牛乳五大升酥一斤以次漸下後藥

麋角

一條炙令黃為散與諸藥同制之

檳榔

通草

秦朮

人參

甘草

菟絲子

酒浸兩宿待乾別搗

肉蓯蓉

各一兩


右搗為散如不要補即不須此藥共煎又可一食時
候藥似稠粥即止火少時歇熱氣即投諸藥散相和
攪令相得仍待少時漸稠粘堪作丸即以新器盛貯
以衆手一時丸就如梧子大若不能衆手丸就旋暖
漸丸亦得如粘手著少酥塗手其服餌之法空腹取
三果漿以下之如無三果漿酒下亦得初服三十丸
日加一丸至五十丸為度日二服初服一百日內忌
房室服經一月腹內諸疾自相驅逐有微利勿恠漸

後多泄氣能食聰耳明目補心神安臟腑填骨髓理
腰脚能久立髮白更黑貌老還少患氣者加枳實青
木香淮前各一大兩若先曾服丹石等藥即以三黃
丸食上壓令宣泄如飲酒食麪口乾鼻中氣粗眼澀
即以蜜漿飲之即止如不止加三黃丸使微利諸凡
如此一度發動已後方始調暢服至二百日面皴自
展光澤一年齒落更生強記身輕若風日行數百里
二年常令人肥飽少食七十以上却成後生三年腸

作筋髓預見未明四年常飽不食自見仙人三十已
下服之不輟顏一定而不變其藥修合時須淨室中
不得令雞犬女人孝子等見婦人服之亦佳

治五臟虛勞小腹弦急脹熱方

灸腎輸五十壯老小損之若虛冷可至百壯橫三間
寸灸之



備急千金要方卷六十

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷六十二

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄舉人臣張元功

謄錄監生臣劉耀馥

欽定四庫全書

備急千金要方卷六十一 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

膀胱腑方

膀胱腑脉論第一

論曰膀胱者主腎也耳中是其候也腎合氣於膀胱膀胱者津液之腑也號水曹掾名玉海重九兩二銖左右疊積上下縱廣九寸受津液九升九合兩邊等應二十

四氣鼻空在外膀胱漏泄

黃帝曰夫五臟各一名一形腎乃獨兩何也岐伯曰膀胱為腑有二處腎亦二形應腑有二處臟名一腑名二故五臟六腑也一說腎有左右而膀胱無二今用當以左腎合膀胱右腎合三焦

左手關後尺中陽絕者無膀胱脉也病苦逆冷婦人月使不調王月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經治陰在足內踝下動脉是也

右手關後尺中陽絕者無子戶脉也病苦足逆寒絕產帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰

左手關後尺中陽實者膀胱實也病苦逆冷脅下邪氣相引痛刺足太陽經治陽在足小趾外側本節後陷中右手關後尺中陽實者膀胱實也病苦小腹滿引腰痛刺足太陽經治陽

病先發於膀胱者背脊筋痛小便閉五日之腎小腹腰脊痛脛痠一日之小腸脹一日之脾閉塞不通身痛體

重二日不已死冬雞鳴夏下晡一云

日夕

膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得
肩上熱若脉陷及足小趾外側及脛踝後皆熱若脉陷
取委中

膀胱脹者小腹滿而氣癢

腎前受病傳於膀胱腎欬不已欬則遺溺

厥氣客於膀胱則夢遊行

腎應骨密理厚皮者三焦膀胱厚粗理薄皮者三焦膀胱

膀胱薄膜理疎者三焦膀胱緩急皮而無毫毛者三焦膀胱急毫毛美而粗者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱結也

扁鵲云六腑有病徹面形腎膀胱與足少陰太陽為表裏膀胱總通於五臟所以五臟有疾即應膀胱膀胱有疾即應胞囊傷熱則小便不通膀胱急尿苦黃赤傷寒則小便數清白或發石水根在膀胱四肢小其腹獨大也

方見治水篇中

骨絕不治齒黃落十日死足太陽之脉起於

目內眥上額交巔上其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下會於後陰下貫臀入膕中其支者從膊內左右別下貫肘一作腕過髀樞循髀外後廉下合膕中以下貫腓內出外踝之後循京骨至小指外側是也動則病衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲一作回膕如結腓如列是為踝厥是主筋所生病者痔瘡狂癲疾頭腦項痛目黃淚出軌衄項背

腰尻膕腓脚皆痛小指不用盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

膀胱虛實第二

脉方
灸法

膀胱實熱

左手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦逆滿腰中痛不可俛仰勞也名曰膀胱實熱也

右手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦胞轉不得小便頭眩痛煩滿脊背強名曰膀胱實熱也

治膀胱實熱方

石膏

兩八

梔子仁

一作瓜
子仁

茯苓

知母

兩各三

蜜

合五

淡竹葉

生地黄

各切
一升

右七味咬咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮二沸
分三服須利加芒硝三兩

治膀胱熱病不已舌乾咽腫方

蜜

合七

升麻

大青

兩各三

射干

生玄參

黃蘗

薔薇根白皮

各四兩

右七味以水七升煮取一升去滓下蜜煮二沸細細含之

膀胱虛冷

左手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦脚中筋急腹中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏枯腰痛外踝後痛名曰膀胱虛冷也

右手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦肌肉

振動脚中筋急耳聾忽忽不聞惡風颼颼作聲名曰膀胱虛冷也

治膀胱虛冷饑不欲飲食面黑如炭腰脅疼痛方

磁石

兩六

黃耆

茯苓

兩各三

五味子

杜仲

兩各四

白朮

白石英

兩各五

右七味咬咀以水九升煮取三升分三服

治膀胱冷欬唾則有血喉鳴喘息方

羊腎

具一

人參

玄參

黃耆

桂心

芎藭

甘草

各三兩

茯苓

四兩

地骨皮

生薑

各五兩

白朮

六兩

右十一味㕮咀以水一斗二升先煮羊腎減三升去腎下藥煮取三升去滓分為三服

龍骨圓治膀胱腎冷坐起欲倒目眈眈氣不足骨痿方

龍骨

栢子仁

乾地黄

甘草

防風

各五分

黃耆

禹餘糧

白石英

桂心

茯苓

各七分

五味子

羌活

人參

附子

各六分

山茱萸

玄參

芎藭

各四分

磁石

杜仲

乾薑

各八分

右二十味為末蜜丸如梧子大空腹酒服三十丸日

二加至四十丸

治膀胱寒小便數漏精稠厚如米白泔方

赤石脂

白石脂

各五分

乾地黄

三分

茯苓

六分

赤雄雞腸

雞臍脰

各兩具

桑螵蛸

牡蠣

龍骨

黃連

各四分

右十味治下篩內雞腸及肚脰中縫塞蒸令熟曝乾
合搗為散以酒和服方寸匕日三

治膀胱方

灸之如腎虛法

胞囊論第三

論方
灸法

論曰胞囊者腎膀胱候也貯津液并尿若臟中熱病者
胞澀小便不通尿黃赤若腑中寒病者胞滑小便數而
多白若至夜則尿偏甚者夜則內陰氣生故熱則瀉之

寒則補之不寒不熱依經調理則病不生矣

凡尿不在胞中為胞屈僻津液不通以蔥葉除尖頭內陰莖孔中深三寸微用口吹之胞脹津液大通即愈

榆皮通滑泄熱煎治腎熱應胞囊澀熱小便黃赤苦不通方

榆白皮

赤蜜

葵子各一升

滑石

通草

各三兩

車前子

五升

右六味咬咀以水三斗煮取七升去滓下蜜更煎取

三升分三服婦人難產亦同此方

滑石湯治膀胱急熱小便黃赤方

滑石

八兩

子芩

三兩

車前子

冬葵子

一升

榆白皮

四兩

右五味㕮咀以水七升煮取三升分三服

治虛勞尿白濁方

右取榆白皮切二斤水二斗煮取五升分五服

又方擣乾羊骨為末服方寸匕日二

又方灸脾輸一百壯 又灸三焦輸百壯 又灸腎輸

百壯 又灸章門百壯在季肋端

凡飽食後或忍小便或走馬或忍小便大走及入房皆致胞轉臍下急滿不通治之方

右用亂髮急纏如兩拳大燒為末醋四合和二方寸匕服之訖即炒熟黑豆葉蹲坐上

治胞轉方

石韋

兩

葵子

通草

甘草

各二兩

鬼箭

三兩

滑石

四兩

榆白皮

一升

右七味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

治丈夫婦人胞轉不得小便八九日者方

葵子

一升

滑石

寒水石

各一斤

右三味㕮咀以水一斗煮取五升分三服

治胞轉小便不得方

蔥白

四七莖

阿膠

一兩

琥珀

三兩

車前子

一升

右四味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

又方阿膠三兩水二升煮取七合頓服

又方豉五合以水三升煮數沸頓服之

又方麻子煮取汁頓服之

又方連軻關燒灰水服之

又方筆頭燒灰水服之

又方燒死蜚蠊二枚末水服之

又方內白魚子莖孔中

又方酒和豬脂雞子大頓服之

治腰痛小便不利苦胞轉方

灸玉泉七壯穴在關元下一寸大人從心下度取八寸是玉泉穴小兒斟酌以取之 又灸第十五椎五十壯 又灸臍下一寸 又灸臍下四寸各隨年壯

三焦脉論第四

論曰夫三焦者一名三關也上焦名三管反射中焦名霍亂下焦名走哺合而為一有名無形主五臟六腑往還神道周身貫體可聞不可見和利精氣決通水道息

氣腸胃之間不可不知也三焦名中清之腑別號玉海
水道出屬膀胱合者雖合而不同上中下三焦同號為
孤腑而榮出中焦衛出上焦榮者絡脉之氣道也衛者
經脉之氣道也其三焦相形厚薄大小並同膀胱之形
云

三焦病者腹脹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則為
水留則為脹候在足太陽之外大絡在太陽少陽之間
亦見于脉取委陽

小腹腫痛不得小便邪在三焦約取太陽大絡視其結
脉與厥陰小絡結而血者腫上及胃管取三里

三焦脹者氣滿於皮膚殼殼而不堅疼

一云殼殼而堅

久欬不已傳之三焦欬而腹滿不欲飲食也手少陽之
脉起於小指次指之端上出兩指之間循手表腕出臂
外兩骨之間上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後
入缺盆交膺中散絡心胞下隔徧屬三焦其支者從膺
中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下額至

頰其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰
至目兌皆是也動則病耳聾輝輝燁燁噤腫喉痺是主
氣所生病者汗出目兌皆痛頰腫耳後肩臑肘臂外皆
痛小指次指不用為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則
疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者
人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

三焦虛實第五

論方
灸法

論曰夫上焦如霧

霧者霏霏起上也

其氣起於胃上管

難經甲一集源

口作上並咽以上貫膈布胃中走腋循足太陰之外而行

還注於手陽明上至舌下注足陽明常與榮衛俱行於陽二十五度行於陰二十五度為一周日夜五十周身周而復始大會於手太陰也主手少陽心肺之病內而不出人有熱則飲食下胃其氣未定汗則出或出於面或出於背身中皆熱不循衛氣之道而出者何也此外傷於風內開腠理毛蒸理泄衛氣走之固不得循其道此氣慄悍滑疾見聞而出故不得從其道名曰漏氣其

病則肘攣痛食先吐而後下其氣不續膈間厭悶所以
飲食先吐而後下也寒則精神不守泄下便痢語聲不
出若實則上絕於心若虛則引氣於肺也

澤瀉湯通脉泄熱治上焦飲食下胃胃氣未定汗出面
背身中皆熱名曰漏氣方

澤瀉

半夏

柴胡

生薑

各三兩

桂心

甘草

各一兩

茯苓

人參

各二兩

地骨皮

五兩

石膏

八兩

竹葉

五合

蓴心

升一

右十二味㕮咀以水二斗煮取六升分五服

一云水一斗煮

取三升分三服

麥門冬理中湯治上焦熱腹滿不欲飲食或食先吐而後下肘攣痛方

麥門冬

生蘆根

竹茹

廩米

各一升

萸心

合五

甘草

茯苓

各二兩

橘皮

人參

姜豉

各三兩

生薑

四兩

白朮

五兩

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服

治胸中膈氣聚痛好吐方

右灸厥陰輸穴在第四椎兩邊各相去一寸五分隨

年壯

黃耆理中湯治上焦虛寒短氣不續語聲不出方

黃耆

桂心

各二兩

五味子

桔梗

乾薑

茯苓

甘草

芡實

各三兩

丹參

杏仁

各四兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升分為三服

黃連圓治上焦冷下痢腹內不安食好注下方

黃連

烏梅肉

各八兩

桂心

二兩

乾薑

附子

阿膠

各四兩

檳皮

芡實

黃蘗

各三兩

右九味為末蜜丸如梧子大飲下二十丸加至三十丸

厚朴湯治上焦閉塞乾嘔嘔而不出熱少冷多好吐白沫清涎吞酸方

厚朴

茯苓

芎藭

白朮

玄參

各四兩

桔梗

附子

人參

橘皮

各三兩

生薑

八兩

吳茱萸

八合

右十一味咬咀以水二斗煮取五升分為五服

論曰中焦如漚

漚者在胃中如漚也

其氣起於胃中管

難經作中口甲乙巢

源作胃口

在上焦之後此受氣者主化水穀之味祕糟粕蒸

津液化為精微上注於肺脉乃化而為血奉以生身莫

貴於此故獨得行於經隧名曰榮氣主足陽明陽明之

別號曰豐隆在外踝上去踝八寸別走太陰絡諸經之
脉上下絡太倉主腐熟五穀不吐不下實則生熱熱則
閉塞不通上下隔絕虛則生寒寒則腹痛洞泄便痢霍
亂主脾胃之病夫血與氣異形而同類衛氣是精血氣
是神故血與氣異名同類焉而脫血者無汗此是神氣
奪汗者無血此是精氣故人有兩死刪繁作一死而無兩生
猶精神之氣隔絕也若虛則補於胃實則瀉於脾調其
中和其源萬不遺一也

大黃瀉熱湯開關格通隔絕治中焦實熱閉塞上下不通隔絕關格不吐不下腹脹膨喘急方

蜀大黃

切以水一升浸

黃芩

澤瀉

升麻

芒硝

各三兩

羚羊角

梔子

各四兩

生玄參

八兩

地黃汁

一升

右九味㕮咀以水七升煮取二升三合下大黃更煮兩沸去滓下硝分三服

藍青圓治中焦熱水穀下痢方

藍青汁

升三

黃連

兩八

黃蘗

兩四

烏梅肉

地膚子

地榆

白朮

兩各二

阿膠

兩五

右八味為末以藍青汁和微火煎丸如杏仁大飲服
三九日二七月七日合大良當併手丸之

黃連煎治中焦寒洞泄下痢或因霍亂後瀉黃白無度
腹中虛痛方

黃連

酸石榴皮

地榆

阿膠

兩各四

黃蘗

當歸

厚朴

乾薑

兩各二

右八味咬咀以水九升煮取三升去滓下阿膠更煎
取烱分三服

治四肢不可舉動多汗洞痢方

右灸大橫隨年壯穴在俠臍兩邊各二寸五分

論曰下焦如瀆

瀆者如溝水決洩也

其氣起下胃管別回腸注於

膀胱而滲入焉故水穀者常并居於胃中成糟粕而俱

下於大腸主足太陽灌滲津液合膀胱主出不主入別

於清濁主肝腎之病候也若實則大小便不通利氣逆

不續嘔吐不禁故曰走哺若虛則大小便不止津液氣絕人飲酒入胃穀未熟而小便獨先下者何蓋酒者熟穀之液也其氣悍以滑故後穀入而先穀出也所以熟則瀉於肝寒則補於腎也

柴胡通塞湯治下焦熱大小便不通方

柴胡

羚羊角

黃芩

橘皮

澤瀉

各三兩

香豉

一升別盛

生地黃

一升

芒硝

二兩

梔子

四兩

石膏

六兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升去滓內芒硝分三服

赤石脂湯治下焦熱或下痢膿血煩悶恍惚方

赤石脂

八兩

烏梅

二十枚

梔子

十四枚

廩米

一升

白朮

升麻

各三兩

乾薑

二兩

右七味㕮咀以水一斗煮米取熟去米下藥煮取二升半分爲三服

止嘔人參湯治下焦熱氣逆不續嘔吐不禁名曰走哺

方

人參

姜蕤

黃芩

知母

茯苓

各三兩

生蘆根

梔子仁

白朮

橘皮

各四兩

石膏

八兩

右十味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

香豉湯治下焦熱毒痢魚腦雜痢赤血臍下小腹絞痛
不可忍欲痢不出方

香豉

薤白

各一升

黃連

黃蘗

白朮

茜根各三兩

梔子

黃芩

地榆

各四兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服

治膀胱三焦津液下大小腸中寒熱赤白泄痢及腰脊痛小便不利婦人帶下方

右炙小腸輸五十壯

黃蘗止洩湯治下焦虛冷大小便洞泄不止方

黃蘗

人參

地榆

阿膠

各三兩

黃連

五兩

茯苓

檳皮

各四兩

艾葉

一升

右八味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下膠消分三

服

人參續氣湯治下焦虛寒津液不止短氣欲絕方

人參

橘皮

茯苓

烏梅

麥門冬

黃耆

乾薑

芡實

各三兩

吳茱萸

三合

桂心

二兩

白朮

厚朴

各四兩

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服

茯苓圓治下焦虛寒損腹中瘀血令人喜忘不欲聞人語胃中噎塞而短氣方

茯苓

乾地黄

當歸

各八分

甘草

乾薑

人參

各七分

黃耆

六分

芍藥

五分

桂心

四分

厚朴

三分

杏仁

五十枚

右十一味為末蜜丸如梧子初服二十九加至三十丸為度日二清白飲下

伏龍肝湯治下焦虛寒損或先見血後便轉此為近血

或利不利方

伏龍肝

五合末

乾地黄

五兩一方用黃蘗

阿膠

牛膝

一作牛蒡根

甘草

乾薑

黃芩

地榆

各三兩

髮灰

二合

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓下膠煮消下髮灰分為三服

治下焦虛寒損或先便轉後見血此為遠血或利或不
利好因勞冷即發宜續斷止血方

續斷

當歸

桂心

蒲黃

阿膠

各一兩

甘草

二兩

乾薑

乾地黄

各四兩

右八味咬咀以水九升煮取三升半去滓下膠取烱

下蒲黃分三服

當歸湯治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦起
或熱損發或因酒發宜此方

當歸

乾薑

小蘗

阿膠

羚羊角

乾地黄

栢枝皮

各三兩

芍藥

白朮

各四兩

蒲黃

五合

青竹茹

半升

伏龍肝

髮灰

一雞子大

黃芩

甘草

各二兩

右十五味咬咀以水一斗二升煮取三升半去滓下

膠取烱次下髮灰及蒲黃分為三服

灸法

五臟六腑心腹滿腰背疼飲食吐逆寒熱往來小便不利羸瘦少氣灸三焦輸隨年壯

腹疾腰痛膀胱寒澀飲注下炎下極輸隨年壯

三焦寒熱炎小腸輸隨年壯

三焦膀胱腎中熱氣炎水道隨年壯穴在俠屈骨相去

五寸

屈骨在臍下五寸屈骨端水道俠兩邊各二寸半

備急千金要方卷六十一

欽定四庫全書

備急千金要方卷六十二 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

膀胱腑方

霍亂第六

論 證
方 灸法

論曰原霍亂之為病也皆因飲食非關鬼神夫飽食臍膈復食乳酪海陸百品無所不噉眠臥冷席多飲寒漿胃中諸食結而不消陰陽二氣擁而反戾陽氣欲升陰

氣欲降陰陽乖隔變成吐痢頭痛如破百節如解遍體諸筋皆為回轉論證雖小卒病之中最為可畏雖臨深履危不足以諭之養生者宜達其旨趣庶可免於夭橫矣

凡霍亂務在溫和將息若冷即遍體轉筋凡此病定一日不食為佳仍須三日少少喫粥三日已後可恣意食息七日勿雜食為佳所以養脾氣也

大凡霍亂皆中食膾酪及飽食雜物過度不能自裁夜

臥失覆不善將息所致以此隕命者衆人生稟命以五臟為主夫五臟者即是五行內為五行外為五味五行五味更宜扶抑所以春夏秋冬逆調理之食啖不可過度凡飲食於五臟相剋者為病相生者無他經曰春不食辛夏無食鹹季夏無食酸秋無食苦冬無食甘此不必全不食但慎其太甚耳諺曰百病從口生蓋不虛也四時昏食不得太飽皆能生病從夏至秋分忌食肥濃然熱月人自好冷食更與肥濃兼食果菜無節極遂逐

冷眠臥冷水洗浴五味更相剋賊雖欲無病不可得也
所以病苦人自作之非關運也書曰非天人人中自
絕命此之謂也

凡諸霍亂忌與米飲胃中得米即吐不止但與厚朴葛
根飲若冬瓜葉飲但沾清咽喉而不可多與若服湯時
隨服吐者候吐定乃止診脉絕不通以桂合葛根為飲
吐下心煩肉熱汗出不轉筋脉急數者可犀角合葛
根為飲吐下不止發熱心煩欲飲水可少飲米粉汁為

佳若不止可與葛根薺芫飲服之

問曰病有霍亂者何師曰嘔吐而利此為霍亂

問曰病者發熱頭痛身體疼惡寒而復吐利當屬何病
師曰當為霍亂霍亂吐利止而復發熱也傷寒其脉微
澀本是霍亂令是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必
利本反下利者不可治也霍亂吐多者必轉筋不渴即
臍上築霍亂而臍上築者為腎氣動當先治其築治中
湯主之去朮加桂心去朮者以朮虛故也加桂者恐作

責也霍亂而臍上築吐多者若下多者霍亂而驚悸
霍亂而渴霍亂而腹中痛嘔而吐利嘔而利欲得水者
皆用治中湯主之

治中湯治霍亂吐下脹滿食不消化心腹痛方

人參

乾薑

白朮

甘草

各三兩

右四味㕮咀以水八升煮取三升分三服不瘥頻服
三劑遠行防霍亂依前作丸如梧子大服三十丸如
作散服方寸匕酒服亦得若轉筋者加石膏三兩

仲景

云若臍上築者腎氣動也去朮加桂心四兩吐多者
去朮加生薑三兩下多者復用朮悸者加茯苓二兩
渴欲得水者加朮合前胡四兩半腹中痛者加人參
合前胡四兩半若寒者加乾薑合前胡四兩半腹滿
者去朮加附子一枚服湯後一食頃
服熱粥一升微自溫勿發揭衣被也

桂枝湯治吐利止而身體痛不休者當消息和解其外

以此湯小和之

方見傷寒篇中

四順湯治霍亂轉筋肉冷汗出嘔哕者方

附子

一兩

人參

乾薑

甘草

各三兩

右四味咬咀以水六升煮取二升分三服

范注云利甚加龍骨

二兩

四逆湯治多寒手足厥冷脉絕方

生薑

八兩

當歸

芍藥

細辛

桂心

各三兩

大棗

二十五枚

通草

甘草

各二兩

吳茱萸

二升

右九味㕮咀以水六升酒六升合煮取五升分五服
舊方用棗三十枚今以霍亂病法多痞故除之如退
棗入葛根二兩佳霍亂四逆加半夏一合附子小者

一枚惡寒乃與大附子

又方治吐下而汗出小便復利或下利清穀裏寒外熱
脉微欲絕或發熱惡寒四肢拘急手足厥方

甘草

二兩

乾薑

一兩半

附子

一枚

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合溫分再服彊

者可與大附子一枚乾薑至三兩

廣濟方若吐後吸少氣及下而腹

滿者加人參一兩

通脉四逆湯治吐利已斷汗出而厥四肢拘急不解脉

微欲絕方

大附子

一枚

甘草

半兩

乾薑

三兩強者四兩

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合分二服脉出

即愈若面色赤者加蔥白九莖腹中痛者去蔥加芍

藥二兩嘔逆加生薑三兩咽痛去芍藥加桔梗一兩

利止脉不出者去桔梗加人參二兩皆與方相應乃

服之

仲景用通脉四逆加猪膽汁湯

竹葉湯治霍亂吐利已服理中四順等湯熱不解者方

竹葉

一握

小麥

一升

生薑

十累

甘草

人參

附子

芍藥

各一兩

橘皮

當歸

桂心

各二兩

白朮

三兩

右十一味咬咀以水一斗半先煮竹葉小麥取八升

去滓下藥煮取三升分三服上氣者加吳茱萸半升

即瘧理中四順湯皆大熱若有熱宜竹葉湯

古今錄驗無芍

藥

甘草瀉心湯治婦人霍亂嘔逆吐涎沫醫反下之心下

即痞當先治其涎沫可服小青龍湯涎沫止次治其痞可與此方

甘草

四兩

乾薑

黃芩

各三兩

黃連

一兩

半夏

半升

大棗

十二枚

右六味咬咀以水一斗煮取六升分六服

小青龍湯治婦人霍亂嘔吐方

見第十卷中

附子粳米湯治霍亂四逆吐少嘔多者方

中附子

一枚

粳米

五合

半夏

半升

大棗

十枚

乾薑

仲景方無

甘草

各一兩

右六味㕮咀以水八升煮藥取米熟去滓分三服

理中散治年老羸劣冷氣惡心飲食不化心腹虛滿拘

急短氣霍亂嘔逆四肢厥冷心煩氣悶流汗扶老方

麥門冬

乾薑

各六兩

人參

白朮

甘草

各五兩

附子

茯苓

各三兩

右七味治下篩以白湯三合服方寸匕常服將蜜丸

如梧子大酒服二十丸

人參湯治毒冷霍亂吐利煩嘔轉筋肉冷汗出手足指
皆腫喘息垂死絕語音不出百方不效脉不通者服此
湯取瘥乃止隨吐續服勿止并灸之方

人參

附子

厚朴

茯苓

甘草

橘皮

當歸

葛根

乾薑

桂心

各二兩

右十味㕮咀以水七升煮取二升半分為三服

治霍亂盡毒宿食不消積冷心腹煩滿鬼氣方

右用極鹹鹽湯三升熱飲一升刺口令吐宿食使盡
不吐更服吐訖復飲三吐乃住靜止此法大勝諸治
俗人以為田舍淺近法鄙而不用守死而已凡有此
病即須先用之

治霍亂方

菹豆

香薷

各一
升

右二味以水六升煮取二升分服單用亦得

治霍亂洞下不止者方

右用艾一把水三升煮取一升頓服之良

又方香薷一把水四升煮取一升頓服之青木香亦佳
治霍亂吐下腹痛方

右以桃葉煎汁服一升立止冬用皮

治霍亂引飲輒乾嘔方

右用生薑五兩咬咀以水五升煮取二升半分二服
高良薑大佳

杜仲圓治霍亂久將遠行預備方

杜仲

藿香

白朮

橘皮

吳茱萸

乾薑

人參

厚朴

木香

雞舌香

瞿麥

桂心

藟荷

女萎

茴香

右十五味等分為末蜜丸如梧子酒下二十丸
治霍亂永不發丸方

虎掌

薇銜

各二兩

枳實

附子

人參

檳榔

乾薑

各三兩

厚朴

六兩

皂莢

三寸

白朮

五兩

右十味為末蜜丸如梧子大每服酒下二十九日三武德中有德行尼名淨明患此已久或一月一發或一月再發發即至死時在朝大醫蔣許甘巢之徒亦不能識余以霍亂治之處此方得愈故疏而記之

凡先服石人因霍亂吐下服諸熱藥吐下得止因即變虛心煩手足熱口燥欲得水嘔逆迷悶脉急數者及時行熱病後毒未盡因霍亂吐下仍發熱心胃欲裂者以

此解之方

薺芫

人參

厚朴

知母

桔萋根

茯苓

犀角

藍子

枳實

桔梗

橘皮

葛根

黃芩

甘草

各二兩

右十四味咬咀以水一斗煮取三升分為三服

治中熱霍亂暴利心煩脉數欲得冷水者方

右以新汲井水頓服一升立愈先患胃口冷者勿服

之

治霍亂醫所不治祕方

右用童女月經衣合血燒末酒服方寸匕百方不瘥者用之

治霍亂轉筋方

右用蓼一把去兩頭以水二升煮取一升頓服之

一方

作梨葉

又方燒舊木梳灰為末酒服一枚小者永瘥

又方車轂中脂塗足心下瘡

治霍亂轉筋入腹無奈何者方

作極鹹鹽湯於槽中暖漬之

又方以酢煮青布搗之冷即易

治轉筋不止者方

男子則以手挽其陰牽之女子則挽其乳近左右邊
灸法

論曰凡霍亂灸之或雖未能立瘥終無死憂不可逆灸

或但先腹痛或先下後吐當隨病狀灸之

若先心痛及先吐者灸巨闕七壯在心下一寸不效更灸如前數

若先腹痛者灸太倉三七壯穴在心厭下四寸臍上一寸不止更灸如前數

若吐下不禁兩手陰陽脉俱疾數者灸心蔽骨下三寸又灸臍下三寸各六七十壯

若乾嘔者灸間使各七壯在手腕後三寸兩筋間不瘥

更灸如前數

若嘔哕者灸心主各七壯在掌腕上約中吐不止更灸如前數

若手足逆冷灸三陰交各七壯在足內踝直上三寸廉骨際未瘥更灸如前數

若先下利者灸穀門二七壯在臍傍二寸男左女右一名大腸募不瘥更灸如前數

若下不止者灸大都七壯在足大趾本節後內側白際

肉際

若泄利所傷煩欲死者灸慈宮二七壯在橫骨兩邊各

二寸半

橫骨在臍下
橫門骨是

轉筋在兩臂及胷中者灸手掌白肉際七壯又灸臍中
中府巨闕胃管尺澤并治筋拘頭及足皆愈

走哺轉筋灸踵踝白肉際各三七壯又灸小腹下橫骨
中央隨年壯

轉筋四厥灸兩乳根黑白際各一壯

轉筋灸湧泉六七壯在足心下當拇指大筋上又灸足

大趾下約中一壯

轉筋不止灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈

轉筋入腹痛欲死四人持手足灸臍上一寸十四壯自
不動勿復持之又灸股裏大筋去陰一寸

霍亂轉筋令病人合面正臥伸兩手著身以繩橫量兩
肘尖頭依繩下俠脊骨兩邊相去各一寸半灸一百壯

無不瘥

肘後云此
華佗法

霍亂已死有暖氣者灸承筋七壯

取繩量圍足從趾至
跟匝捻取等折一半

以度令一頭至跟踏地處
引繩上至度頭即是穴

起死人又以鹽內臍中灸二

七壯

雜補第七

論方

論曰彭祖云使人丁壯不老房室不勞損氣力顏色不衰者莫過麋角其法刮為末十兩用生附子一枚合之酒服方寸匕日三大良亦可燖令微黃單服之亦令人不老然遲緩不及附子者又以雀卵和為丸彌佳服之二十日大效

琥珀散治虛勞百病除陰痿精清力不足大小便不利
如淋狀腦門受寒氣結在關元強行陰陽精少餘瀝腰
脊痛四肢重咽乾口燥食無常味乏氣力遠視眈眈驚
悸不安五臟虛勞上氣滿悶方

琥珀

研

蕪菁子

胡麻子

車前子

蛇床子

菟絲子

枸杞子

菴藺子

麥門冬

各一升

橘皮

肉蓯蓉

松脂

牡蠣

各四兩

松子

栢子

荏子

各三升

桂心

石韋

石斛

滑石

茯苓

芎藭

人參

杜蘅

續斷

遠志

當歸

牛膝

牡丹

各三兩

通草

十四分

右三十味各治下篩合擣二千杵盛以韋囊先食服
方寸七日三夜一用牛羊乳汁煎令熟長服令人彊

性輕體益氣消穀能食耐寒暑百病除雖御十女不
勞損令精實如膏服後七十日可得行房久服老而
更少髮白反黑齒落重生

從蓉散主輕身益氣彊骨補髓不足能使陰氣強盛方

肉從蓉

五味子

遠志

甘草

各一斤

生地黃

三十斤
取汁

慎火草

切

楮子

乾漆

各二升

右八味以地黃汁浸一宿出曝乾復漬令汁盡為散

空腹酒服方寸七日三服三十日力倍常雖御十女

無損

禿雞散有房室人常服勿絕方

蛇床子

菟絲子

遠志

防風

五味子

巴戟

杜仲

茯苓

各二兩

右八味治下篩酒服方寸七日二無室勿服

天雄散治五勞七傷陰痿不起衰損者方

天雄

五味子

遠志

各一兩

茯苓

十分

蛇床子

菟絲子

各六兩

右六味治下節酒服方寸匕日三常服勿止

治陰下濕癢生瘡失精陰痿方

牡蒙

菟絲子

栢子仁

蛇床子

茯苓

各二兩

右五味治下節酒服方寸匕日三以知為度

治陰痿精薄而冷方

茯苓

鍾乳

遠志

蛇床子

續斷

薯蕷

鹿茸

各三兩

右七味治下篩酒下方寸匕日二欲多房室倍蛇床
欲堅倍遠志欲大倍鹿茸欲多精倍鍾乳

治五勞七傷庶事衰惡方

巴戟天

蛇牀子

天雄

薯蕷

各三分

雄蠶蛾

十枚

五味子

石斛

茯苓

各五分

菟絲子

牛膝

遠志

各二分

右十一味治下篩以酒服方寸匕日三

石硫黃散極益房勞嗽虛損方

石硫黃

白石英

鹿茸

遠志

蛇牀子

五味子

天雄

殭蠶

白馬莖

菟絲子

女姜

各等分

右十一味治下節酒服方寸七日三無房勿服

又方羅摩

六兩

五味子

酸棗仁

栢子仁

乾地黄

枸杞根皮

各三兩

右六味治下節酒服方寸七日三

又方車前子莖葉根治下篩服方寸匕彊陰益精

常餌補方

枸杞子

一斤

天雄

三兩

茯苓

石斛

乾薑

各八兩

菟絲子

遠志

續斷

各五兩

乾地黄

十兩

石九味治下篩酒服方寸匕日二食無所忌服藥十

日候莖頭紫色乃可行房

治男子陰氣衰腰背痛苦寒莖消少精小便餘瀝出失

精囊下濕癢虛乏服此令人充實肌膚肥悅方

巴戟天

菟絲子

杜仲

桑螵蛸

石斛

右五味等分治下篩酒服方寸匕日一常服佳

又方薯蕷

巴戟天

山茱萸

丹參

人參

各五分

蛇牀子

五味子

各四分

天雄

細辛

各三分

桂心

二分

乾地黄

十分

右十一味治下篩酒服方寸匕日二夜一

又方五味子

蛇牀子

各二兩

續斷

牛膝

各三兩

車前子

茯苓

各四兩

右六味治下節酒服方寸匕日二

杜仲散益氣補虛治男子羸瘦短氣五臟痿損腰痛不能房室方

杜仲

蛇牀子

五味子

乾地黄

各六分

茯苓

遠志

各八分

木防己

五分

巴戟天

七分

菟絲子

十分

右九味治下節食前酒服方寸匕日二長服不絕佳

茯苓散補虛益陽治陽氣不足陰囊濕癢尿有餘瀝漏

洩虛損云為不起方

又方
見前

茯苓

續斷

各八分

蛇牀子

九分

五味子

天雄

薯蕷

各七分

遠志

六分

乾地黄

巴戟天

各五分

右九味治下節酒服方寸匕日三凡病皆由醉飽後
或疲極之餘而合陰陽致成此病也

白馬莖圓治空房獨怒見敵不興口乾汗出失精囊下
濕癢尿有餘瀝卵偏大引疼膝冷脛痠目中眵眵小腹
急腰脊強男子百病方

白馬莖

石韋

天雄

遠志

赤石脂

蛇牀子

菖蒲

薯蕷

杜仲

枯薑根

肉蓯蓉

石斛

續斷

牛膝

山茱萸

栢子仁

細辛

防風

各八分

右十八味為末白蜜丸如梧子大酒服四丸日再服
漸加至二十九七日知一月日百病愈

治陰痿方

雄雞肝

一具

鯉魚膽

一枚

右二味陰乾百日為末雀卵和丸如小豆大吞一丸

又方菟絲子

一升

雄雞肝

三具陰乾百日

右二味為末雀卵和丸如小豆大每服一丸日三

又方乾漆

白朮

甘草

菟絲子

茯苓

牛膝

巴戟天

五味子

桂心

各三兩

石南

石龍芮

各一兩

乾地黄

四兩

右十二味為末蜜和丸如梧桐子酒服二十九日三
又方用蜂房灰夜臥傅之

又方用原蠶蛾未連者一升陰乾去頭足毛羽為末白
蜜丸如梧子大每用一丸夜臥鹽湯下

又方磁石五斤研清酒三斗漬二七日每服二合日三
夜一

又方常服天門冬亦佳

又方五味子一斤新好者治下篩酒服方寸匕日三稍加至三七無所慎忌食猪魚大蒜大醋盡一劑即得力百日已上可見功效服藥常令相續不絕四時勿廢功能自知

又方菟絲子

五味子

蛇牀子

各等分

右三味為末蜜丸如梧子飲服三丸日三

又方蛇牀子

菟絲子

杜仲

各五分

茯苓

八分

五味子

分四

右五味為末蜜丸如梧子每服酒下十四丸日二夜

一

又方蛇牀子

末三兩

菟絲子

汁二合

右二味相和用

又方蛇牀子

茯苓

遠志

各三分

附子

一分

右四味為末以唾和丸如梧子大每用一丸

又方蛇牀子

分三

天雄

遠志

各二分


桂心

一分

無食子

一枚

右五味為末用



備急千金要方卷六十二